



ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ

117997, г. Москва,  
Ул. Академика Опарина, д.4

Тел.: (495) 438-7287  
Тел/факс: (495) 438-9429

«23» июня 2016 г. № 22-1/112

Главным специалистам по акушерству и гинекологии  
органов управления здравоохранением  
субъектов Российской Федерации


Уважаемые коллеги,

В дополнение к Клиническим рекомендациям (Протокол лечения)  
«Выкидыш в ранние сроки беременности: диагностика и тактика  
ведения», исходящий номер письма МЗ РФ 15-4/10/2-3284 от 07 июня 2016  
г.

Обращаем внимание, что назначение препарата микронизированный  
прогестерон в капсулах при лечении привычного и угрожающего выкидышей  
в ранние сроки следует осуществлять в соответствии с Инструкцией МЗ РФ  
в 1 и 2 триместрах беременности, интравагинально, по 100-200 мг 2 раза в  
сутки (200-400 мг/сут)\*.

\*Инструкции МЗ РФ по применению микронизированного прогестерона в  
капсулах (Регистрационные удостоверения ЛС-000 186, ЛП-000284, ЛП-  
000698)

Президент Российского общества  
акушеров-гинекологов, академик РАН



В.Н. Серов

Главный внештатный специалист  
Минздрава России по акушерству и гинекологии  
академик РАН

Л.В. Адамян